



Пример анапластической карциномы в
предшествовавшей ИНКАРСУЛИРОВАННОЙ
ВД карциноме щитовидной железы



Анамнез

- М, 51 год
- УЗИ – узел щитовидной железы, 2 см, гиперэхогенный
- Толстый ободок Хало


Световая микроскопия x40







Световая микроскопия x400





Диморфная карцинома щитовидной железы



Иммуногистохимическое исследование



ИГХ: индекс пролиферативной активности Ki67



Итоговое заключение:

- Анапластическая карцинома, 2,0 см, саркомоподобный вариант, в инкапсулированной фолликулярной карциноме щитовидной железы
- Особенности случая:
- *ранняя диагностика АК*
- *Наличие в одной опухоли 3 паттернов: остатков ФА (микрофолликулярное строение); остатков НДФК (В-клеточной) и преобладающей АК*
- *пациентка жива и здорова*
- *Своеобразный ИГХ профиль: при полной утрате TTF-1 в обоих компонентах - в дифференцированном компоненте выраженная экспрессия CK19 (+++), умеренная HBME-1 (++)*
- *Однотипная экспрессия индекса пролиферативной активности Ki67 (~35%)*

PS. Произошло чудо исцеления от
анапластической карциномы
щитовидной железы

